Pic à tête rouge

Menacé au Québec - Menacé au Canada

CARACTÉRISTIQUES

- Tête, cou et gorge rouge vif;
- Parties inférieures blanches et croupion blanc;
- Grande tache blanche sur les ailes;
- Queue noire, dos noir bleuté.

♂♀ Avril

Mi-avril à mi-août

Fin mai à mi-septembre

HABITAT

- Forêts de feuillus ouvertes;
- Terrains déboisés avec présence de quelques arbres;
- Lisière des forêts;
- L'espèce niche dans des cavités d'arbres morts (chicots);
- L'espèce passe principalement l'hiver aux États-Unis, mais peut être présente au Québec toute l'année.

RÉPARTITION AU QUÉBEC



Source : CDPNQ

MENACES

- La coupe des arbres dépérissants qui contribue à diminuer le nombre de chicots disponibles et qui fait augmenter la compétition entre les différentes espèces fauniques, pour l'utilisation des cavités de nidification;
- La maladie des arbres contribuant à la réduction de la disponibilité ou la quantité d'arbres de grande taille et à la réduction de la disponibilité de certaines sources alimentaires pour l'espèce, telles que les faines et autres types de noix;
- Conversion de boisés à des fins de développement résidentiel et agricole;
- Déclin des populations d'insectes, causé par l'utilisation de pesticides.

AMÉNAGER SON BOISÉ EN MAINTENANT LA BIODIVERSITÉ



Éviter les travaux pendant la période de reproduction et d'élevage des jeunes.

Suivre les recommandations d'aménagement des fiches Chicots et Milieux ouverts.

Illustrations : Sophie-Anne Vachon et Émilie Dumais

Pour les références et en savoir plus, visitez foretprivee.ca/biodiversite

Réalisée par CONSERVATION DE LA NATURE CANADA et Fédération des producteurs forestiers du Québec

Ce projet a été réalisé avec l'appui financier de :
This project was undertaken with the financial support of:

Environnement et Changement climatique Canada
Environment and Climate Change Canada
AFM Agence forestière de la Montérégie
Fondation de la faune du Québec
Québec